

POSTERS

CONFIRMANCE FOETALE AIGUE : CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DANS UNE MATERNITE DE REFERENCE

P.1: LES DEPASSEMENT DE TERME PRONOSTIC MATERNEL ET FOETAL

AUTEURS : Drs.MISSAOUI M N; FREJ A; ZORGUI A; JELLITI M.

HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE
Service de Gynécologie obstétrique

A travers une étude rétrospective de 200 grossesses prolongées, les auteurs se proposent de mettre en valeur les facteurs influençant le pronostic maternel et foetal.

En dehors d'un taux plus élevé de césarienne le pronostic maternel est jugé bon par contre le pronostic foetal est mis en jeu, en effet le dépassement de terme augmente le risque de souffrance foetale aiguë pendant le travail alors que cette souffrance est quasi-constant pendant l'expulsion ce qui augmente le taux d'extraction instrumentale.

Le syndrome de foetus post-mature est retrouvé dans 8 % seulement, la mortalité néonatale reste élevée 6 % , l'inhalation méconiale avec ses conséquences graves est retrouvée dans 18 % des cas.

P.2 :LA SOUFFRANCE FOETALE AIGUE : CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DANS UNE MATERNITE DE REFERENCE

AUTEURS:Drs.MISSAOUI MN.;FREJ A.; ZORGUI A.; JELLITI M.
HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE
Service de Gynecologie obstétrique

La souffrance foetale aiguë est toujours un sujet d'actualité quelque soit le lieu ou le degrés de la structure d'accueil (maternité de premier, deuxième ou de troisième degrés), car elle conditionne l'avenir a court et a long terme du nouveau-né.

A travers une étude analytique rétrospective des dossiers

durant le travail pendant l'année 1997 nous proposons une stratégie d'amélioration des services données à ces nouveau-nés en mettant en exergue les conditions de prise en charge.

Les résultats sont confrontés à la littérature.

P. 3 : L'AMENORRHEE PRIMAIRE D'ORIGINE OVARIENNE CHEZ LA JEUNE FILLE A PROPOS DE 7 CAS

AUTEURS : Drs. : MISSAOUI M. N. ; FREJ A.; ZORGUI A.
JELLITI M

HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE
Service de Gynécologie obstétrique

Une étude prospective portant sur 7 cas d'aménorrhée primaire d'origine ovarienne colligées au service de gynécologie obstétrique de l'Hôpital Régional de Kasserine durant une période de 5 ans (1993 - 1997).

Pathologie relativement rare, sa fréquence est de 0.41 % dans la population générale, l'âge moyen de consultation est de 17 ans.

L'étiologie est souvent congénitale.

L'échographie pelvienne évoque de diagnostic, qui sera confirmé par la biologie (FSH, LH, oestrogène, progestérone), l'apport de la coelioscopie est discutable.

Le traitement est le plus souvent symptomatique.

P. 4 : EVALUATION DU PROGRAMME NATIONAL DE PERINATALITE A SIDI ALOUANE DE 1994 - 1997

AUTEURS : Drs : METHAMEN N. . MESSAOUDI A.
Mr.M'BARK A.

HOPITAL DE CIRCONSCRIPTION DE SIDI ALOUANE.

Les auteurs etudient sur quatre ans les differents indicateurs de couverture prenatale ; post-natale et des accouchements en milieu assisté et de santé de la femme enceinte.

P.5 :EVALUATION DE LA QUALITE DE SURVEILLANCE ANTE-NATALE DANS UNE MATERNITE DE REFFERENCE SUR UNE PERIODE DE DEUX ANS

AUTEURS:Drs.MISSAOUI M N, FREJ A, ZORGUI A, JELLITI M.

HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE
Service de Gynécologie obstétrique

La surveillance ante-natale correcte et attentive joue un rôle déterminant dans la prévention de la morbidité et la mortalité materno-foetale.

Les auteurs se proposent d'évaluer la qualité de la surveillance et la prise en charge des parturientes pendant la période ante-natale dans le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital régional de Kasserine.

Il s'agit d'une étude rétrospective s'étalant sur deux ans (1/1/96 au 31/12/97) nous avons fixé pour but de dégager les indices de qualité déterminant dans la prévention des accidents et les incidents materno-foetaux durant la période d'accouchement.

Nos résultats montrent que 60 % des FAR de la région ont bénéficiés d'un accouchement assisté.

Dans la totalité des cas la surveillance ante-natale a été jugée correcte en se basant sur le dossier médical (examen clinique et para-clinique), dans 30 % seulement l'assistance du médecin pendant l'accouchement était nécessaire.

La mortalité maternelle est nulle, la mortalité néonatale est de 2,57 % alors que la morbidité foetale avait un taux de 11,8 % .

Ces résultats montrent que certains de nos objectifs sont atteints mais il y'a des insuffisances sur le plan de la qualité, des efforts sont nécessaires pour renforcer la qualité et ce par la formation du personnel (sage -femme et médecins).

6 : LA PRISE EN CHARGE DES KYSTES OVARIENS A L'HOPITAL REGIONAL DE SIDI BOUZID

MEFTAH A., HIZI MM., KARRAY T, NEGRA R.

Depuis la généralisation des explorations échographiques le diagnostic de kyste ovarien a pris beaucoup d'ampleur.

Mai si ce diagnostic est devenu d'une simplicité évidente il n'en est pas de même pour les indications thérapeutiques.

Plusieurs questions peuvent se poser :

** Kyste fonctionnel ou kyste organique? Sachant que la patiente ayant déjà fixé la notion de kyste dans sa mémoire réclamé la sanction chirurgicale de crainte de complications hypothétiques.*

** Kyste organique « certes » mais malgré toutes les garanties cliniques et échographiques de bénignité quelques cas suspects sont rencontrés en per opératoire, devant cette situation faut-il être radical ou simpliste ? d'autant qu'on ne dispose pas d'examen histologique en extemporané.*

Pour étudier leurs caractéristiques épidémiologiques anatomiques et histologiques nous avons procédé à une étude rétrospective de 92 cas de kystes ovariens opérés au service de gynéco de l'Hôpital Régional de Sidi Bouzid.

7 :LE GUIDE ARABE MODERNE DE LA FEMME ENCEINTE

AUTEUR : Dr. RHIMI Z.

L'éducation sanitaire peut être considérée comme l'un des meilleures moyens de la prévention. Cette dernière est la voie privilégiée

de la médecine moderne. Le guide arabe moderne de la femme enceinte apporte une contribution à l'éducation sanitaire. Il essaie de répondre aux questions que pose la femme enceinte au cours de sa visite médicale, et ceci d'une manière simple et complète selon un style moderne, prenant en considération les traditions et les rites arabes ainsi que les données médicales les plus récentes.

Toutes les informations sont présentées aux lecteurs selon un tableau mensuel comprenant deux parties l'une pour la lecture rapide et essentielle, l'autre partie est réservée aux explications complémentaires détaillées comprenant des petites histoires médicales célèbres se rapportant à chaque chapitre et lui conférant un côté de lecture agréable.

8:LE PROFIL DES PARTURIANTES LA MATERNITE DE THALA AUCOURS DE L'ANNEE 1997

**:Drs. DALHOUMI M.;LOUHICHI R.; JEDLY M.;
JELLITI M. BEN ABDALLAH N.**

HOPITAL DE CIRCONSCRIPTION DE THALA

585 femmes ont été admises pour accouchement à la maternité de Thala aucours de 1997.

- 492 accouchements ont été réalisés.
- 83 transferts effectués à la maternité régionale.
- 16 femmes ont un âge inférieur à 18 ans.
- 134 femmes ont un âge supérieur à 35 ans.
- Parmi ces femmes 83 seulement ont respecté la calendrier de la consultation prénatale.
- 152 femmes ont une parité supérieurs à 5.
- 303 femmes ont eu la deuxième grossesse avant 24 mois.

Des efforts supplémentaires doivent être déployés en matière d'éducation pour la santé pour améliorer la santé reproductive dans notre circonscription.

P. 9: EVALUATION DU PROGRAMME NATIONAL DU P.F. A SIDI ALOUANE DU 1994 AU 1997

AUTEURS : Drs : MESSAOUDI A. . METHAMEN N. .
Mr : M'BAREK A.

HOPITAL DE CIRCONSCRIPTION DE SIDI ALOUAN.

Les auteurs etudient sur quatre ans , l'évolution de l'incidence et de la prévalence de la contraception , ainsi que les taux de couvertures pour les différentes méthodes contraceptives

10 :EVALUATION DES RESULTATS DU PROGRAMME NATIONAL DE SURVEILLANCE DE LA CROISSANCE D'ENFANT EN 1996 - 1997 DANS LA REGION DE SBEITLA

AUTEURS : Dr. BEN YOUSSEF A., Dr. BEN YOUSSEF F.,
Dr. ALOUI M.T., Dr. ESSAFI M. , Dr. GHODBANI M. M.

HOPITAL DE CIRCONSCRIPTION DE SBEITLA

Le Programme National de Surveillance de la croissance constitue une tache essentielle dans un centre de Soins de Santé de base. Il permet le dépistage et la prévention des carences alimentaires.

Une croissance normale témoigne d'une alimentation saine et équilibrée.

L'étude des résultats de ce programme nous a permis de déduire

- *La croissance est normale dans plus de 85 % des cas.*
- *Le nombre d'Hypotrophiques a légèrement augmenté en 1997 passant de 10,7 % à 12,9 % des cas.*
- *Le nombre d'obèses est inférieur à 1 %.*

Nous avons également remarqué que 93 % de cette activité est effectuée de façon rigoureuse a le P.M.I. alors qu'elle est négligée aux centre périphériques par manque de matériel ou de formation du personnel concerné.

Nous avons conclu qu'un certain nombre de mesures doivent être prises dans le but de généraliser ce programme national à tous les centres périphériques et afin de mieux prendre en charge les enfants hypotrophiques.

رؤية على حاضر الأمراض المنقولة جنسيا وطرق التشخيص والعلاج في منطقة تالة

قمنا بفحص 390 ملفا مرضيا لمتردات تم إستقبالهن خلال عام 1997 بهدف إظهار مدى نجاعة الطرق المستخدمة في تشخيص وعلاج إنتهايات الجهاز التناسلي المتسببة عن الأمراض المنقولة جنسيا في ضوء الإمكانيات المتاحة .

تتلخص هذه الطريقة في : إدارة حوار إيجابي (Un entretien Favorable) مع المريضة

يمكننا من معرفة مجموعة الأعراض التي تشكو منها (La méthode syndromique) + أو - المشاهدات الإكلينيكية (La méthode clinique) وتسجيل ذلك في نموذج مقترح يحدد لنا النشاط الجنسي للمريضة وقربنها . أظهرت هذه الملفات معاناة 183 (47 %) حالة من الإفرازات المهبلية المرضية بأنواعها المختلفة و 148 (38 %) حالة من الإنتهايات المزمنة بعنق الرحم مصحوبة بإفرازات مهبلية مرضية و 214 (55 %) حالة من إنتهايات خلوية بعنق الرحم وحالتين (0.5 %) من قرحة جنسية و 177 (45 %) حالة من آلام أسفل البطن .

وقد تم التشخيص في زيارة واحدة وتراوحت تكلفة العلاج المبدئية بين 0.132 إلى 3.870 د لكل مريضة وقد ترتفع إلى 100 د في حالات أخرى وكان متوسط تردد المريضة بعد ذلك طلبا للعلاج 1.7 زيارة وعلى الرغم من إنخفاض تكلفة العلاج لمعظم هذه الإنتهايات إلا أن عدم إتباع التعليمات وعدم إلزام القرين بأخذ العلاج يمكن أن يزيد هذه التكلفة عشرات المرات .

أثبتت هذه الطريقة :

- قدرتها على تشخيص وعلاج إنتهايات الجهاز التناسلي في مراكز الصحة الأولية وإمكانية إعتادها وتعليمها للقوالب والممرضات توفيراً للوقت والمال وتشجيعاً للمريضة على طلب العلاج والإستمرار فيه دون التنقل إلى المراكز المتخصصة البعيدة .
- إقتران هذه الطريقة بتنمية الوعي لدى المترددات عن طريق الحوار الإيجابي بطرح الأسئلة وتلقي الإجابات ونقل الرسالة إلى الأطراف الأخرى في المجتمع .

- إحترام خصوصيات المرأة أو قربنها الجنسي عند طلب العلاج بدون التصميم على إجراء الكشف الطبي السريري إعتاداً على الحوار في التشخيص وتقديم التوجيهات ونشر الرسالة بين المريضة وقربنها .

- إعتاد هذه النسب على عينة عشوائية (Echantillon randomisé) من النساء المترددات بأعراض مختلفة دون الإعتاد على التحاليل القياسية والذي كان من الممكن أن تكشف نسباً أكثر وحالات أخطر (الحالات الصامتة) وأن تغير طريقة إستعمال الأدوية بالنسبة إلى عدد الحالات كل هذا لا ينفي أن الإستفادة أكثر من الفاقد .

- بينت هذه الطريقة نسب هذه الإنتهايات بين المريضات بأمراض مختلفة ولم تظهر نسب إنتشار الأمراض المنقولة جنسيا بين أفراد المجتمع والتي تحتاج لإجراء التحاليل البيولوجية والسيرولوجية وإلى فريق عمل متكامل .

- بينت هذه الطريقة أن التوسع في الخدمات الصحية لا يتصادم مع وجود محدودات طبية أو إجتماعية أو ثقافية وإنه يمكن تطويع عمليات التشخيص والعلاج للتقليل على قدر المستطاع من فاعلية هذه المحددات .

الدكتور محمد مصطفى شرف

طبيب أمراض النساء والتوليد

مركز الصحة الإيجابية بتالة

12 :L'EPIDEMIE VIRALE DE LA SAISON HIVERNALE 1988 VECUE PAR LE SERVICE D'URGENCE DE L'HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE

AUTEURS : Drs. BOUZIDI L. Dr. JELLITI M. Dr. ZORGUI A.
Dr. MISSAOUI M N. Dr. DALHOUMI M.
NASRI M.

Aucours des mois de Février et Mars 1998 la Tunisie a connu une épidémie virale, se traduisant essentiellement par un syndrome grippal souvent associé à une symptomatologie respiratoire, gastro - entérique et parfois hémorragique.

L'équipe du service d'urgence de l'hôpital régional de Kasserine propose dans ce travail une étude analytique des aspects épidémiologiques, clinique et de l'impact de cette épidémie sur la consommation de médicaments dans le service.

P. 13 :LES CAUSES DU RETARD SCOLAIRE A TRAVERS L ' ETUDE DU STATUT FAMILIAL ET SOCIAL DE 103 ELEVES REDOUBLANTS DANS LA REGION DE LAYOUN

AUTEURS: Drs. ALOUI M. T.BEN YOUSSEF A.BEN YOUSSEF F.
GHODBANI M. M.

HOPITAL DE CIRCONSCRIPTION DE SBEITLA

Les facteurs familiaux et environnementaux ont un rôle primordial dans l'équilibre psychoaffectif et social de l'élève. Le moindre souci est SOURCE de perturbations diverses en l'occurrence un retard scolaire.

Notre étude a porté sur 103 élèves redoublants poursuivant leurs études dans le 1er cycle de l'enseignement secondaire, la majorité soit 90 % des cas sont en 2ème année.

- Leurs âge est supérieur à 15 ans dans 100 % des cas.*
- Ils ont débuté leur scolarité à 6 ans dans 92 % des cas.*
- 75 % des élèves soit 3 fois sur 4 sont issus d'une famille nombreuse (Nombre d'enfants supérieur à 5) , le mariage est consanguin environ 1 fois*
- Pour ce qui est du niveau d'instruction des parents, le père est analphabète ou à un niveau (koutteb) dans 54 % des cas.*

La mère est analphabète dans 80 % des cas.

- Une famille instable divorcé ou décès d'un parent est retrouvée dans 30 % des cas.

- 73 % de ces élèves habitent dans un milieu agricole et n'ont aucun moyen de distraction (Radio Télévision), ils habitent une maison traditionnel dans 42 % des cas dépourvue d'eau, dépourvue d'électricité environ 1 fois.

*Le père de ces élèves est ouvrier journalier dans 42 % des cas
Nous constatons qu'une famille nombreuse avec des conditions*

P. 14 : GOITRE PLONGEANT D'EXTENSION EDIASTINALE POSTERIEURE A PROPOS D'UN CAS

AUTEURS: N.BELTAIEF, G. BESBES , N.JLAIL , .B.JABALLAH
T. KHALFAT , R. DENGUIR , A. ABID ,
A.EL KHEDIM , S. HACHICHA.

SCE ORL ET CMF EPS LA RABTA

SCE CHIRURGIE CARDIO VASCULAIRE EPS LA RABTA

Les goitres plongeants (G.P.) sont rares puisqu'il ne dépassent pas le taux de 10 % dans la plupart des publications.

Ils sont dzns la majorité des cas a extension médiastinale antérieure (85 à 93 % des cas) alors que l'extension dans le médiastin postérieur est beaucoup plus rare (7 à 15 % des cas) .

Ces G.P. posent classiquement des problèmes à la fois diagnostiques mais aussi thérapeutiques.

Les auteurs rapportent dans ce travail un cas de G.P. dans le médiastin postérieur ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale par voie cervicale avec des suites favorables.

A travers ce cas, et une revue de la littérature, ils rappellent les modalités de prise en charge de ces G. P. Depuis l'étape diagnostique jusqu'à l'étape thérapeutique.

P. 15 : TRAITEMENT ORTHODONTIQUE D'UN CAS DE CLASSE IDOM AVEC BEANCE ANTERIEURE

AUTEURS : Drs. ZAHRA L., BOUAZIZI K, EL HAOUITTI A.,
BEN AMOR ,N. ELTAIEL

Il s'agit d'un cas de classe 1 d'angle classe 1 squelettique avec dysharmonie dento-maxillaire associée à une béance antérieure. Le traitement a consisté en un appareillage mullibaque et quatre extractions.

16: TRAITEMENT ORTHODONTIQUE AVEC TRACTIONS ALYPIQUES (43-33).

AUTEURS : EL HAOUITTI E., SELMI R. , ZAHRA D. ELTAIEF N.

Il s'agit d'un traitement orthodontique d'une malocclusion avec des extractions inhabituelles des canines mandibulaires qui présentaient une parodontopathie sévère.

P. 17 : TRAITEMENT D'UN CAS DE CLASSE 1 DDM LEGERE SANS EXTRACTIONS

AUTEURS : Drs. ZAHRA D., BELKAHIA I., TOBBI S.
BEN AMOR A.

C'est un traitement orthodontique d'un cas de classe 1 avec un léger encombrement et un profil harmonieux sans extraction des prémolaires.

Service Orthopédie Donto-faciale

P. 18 : L'EPIDEMIE DE GRIPPE EST ELLE LA CAUSE REELLE DU DEPASSEMENT BUDGETAIRE AU COURS DU 1er TRIMESTRE 1998

AUTEURS : Drs : DALHOUMI M. . LOUHICHI R. JEDLY M.
JELLITI M.

Mrs. : HAYOUNI R. . BEN ABDALLAH N.

HOPITAL DE CIRCONSCRIPTION DE THALA

Au cours du 1er trimestre 1997 nous avons enregistré un dépassement budgétaire de 8.351. D par rapport au budget théorique alloué à cette période soit une augmentation de 48.25 % .

L'épidémie de grippe ne peut expliquer qu' une partie de ce dépassement 16%.

Cela ne peut être expliquer que part l' augmentation excessive du coût moyen de l' ordonnance.

P. 19 : LA MALADIE D'ALBERS SCHONBERG : A PROPOS DE DEUX CAS .

AUTEURS : Drs: FREJ A. ; MISSAOUI MN. ;ZORGUI A.; KHALLEL H.;
DAOUD H.

HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE

Bien qu' elle soit toujours secondaire a un défaut de fonctionnement de l' ostéoclaste ,la maladie d'ALBERS SCHONBERG (A S B) est une pathologie très hétérogène et au sein de la forme autosomique récessive infantile la plus fréquente , les auteurs ont individualisé trois formes cliniques :

+ Une forme maligne .

+ Une forme bénigne.

+ Et un syndrome associant maladie ASB , acidose tubulaire, retard mental et calcification intra crânienne .

Nous rapportons dans ce sujet deux cas de la maladie ASB que nous classons dans la forme la plus grave ou forme maligne.

P. 20: DEFICIT EN GH : TEMOIGNAGE PAR QUELQUES CAS.

*AUTEUR : DR BELKAHLA I.
FACULTE DE MEDECINE DENTAIRE MONASTIR.*

Durant notre stage dans un centre hospitalo universitaire a sousse et en collaboration avec le service de pédiatrie ,6 cas d' enfants présentant un déficit en hormone de croissance (Growth Hormon) ;ont été entourés par nos soins bucco dentaires. Une analyse médicale(poids , âge , taille et croissance) a été présenté pour chacun des enfants âgés de 6 a 14 ans .

Nous présentons dans ce travail les répercutions bucco dentaires et les éléments de déficit en GH.

P. 21: MISSION DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE

*AUTEUR : DR AZABOU S.
CIRCONSCRIPTION DE FERIANA*

La mission principale de la pharmacie hospitalière est d'offrir le bon médicament au malade dans de bonnes conditions ». Le système actuel de distribution des médicament dans notre établissement est du type globale avec une armoire à pharmacie dans les service de soins gérée par les infirmiers. Une organisation permettant la gestion de ces armoires de service par le personnel pharmaceutique a été mise en place progressivement.

L'évaluation de cette organisation à permis de mètre en évidence l'insuffisance du fonctionnement antérieur et l'apport déterminant du personnel pharmaceutique en terme de coût et de sécurité sur la gestion des médicament. Avec l'octroi de moyens humain et matériels adéquats le service pharmaceutique devrait prendre en charge la

P.22 : MAITRISER LE COUT D'UNE ORDONNANCE AU COURS D'UNE EPIDEMIE DE GRIPPE (EVRIER 98) AU CENTRE DE PMI DE SBETLA.

AUTEURS : Dr. KORTLI F., Dr. BEN YOUSSEF F., Mme KHOUNI R.
Mme GOUSSI H.

Depuis quelques années les médecins sont sensibilisés à être les premiers responsables de la gestion des médicaments et essayent, autant que possible, de diminuer le coût d'une ordonnance pour compenser les dépassements budgétaires qui sont accumulés depuis plusieurs années.

Au cours d'une épidémie de grippe au mois de Février 98 au Centre de P.M.I. de Sbeitla nous avons étudié le coût moyen et les composantes d'une ordonnance. Sur 802 malades atteints d'une infection respiratoire aiguë (I.R.A.) 10 ont été hospitalisés et sur les 792 restants, le coût moyen d'une ordonnance est de 1.648 (coût bien inférieur à la moyenne nationale : 2.000).

Il est représenté par :

- les antibiotiques : 541 % du coût
- les antipyrétique : 16,39 %
- les antitussifs + BD : 9,56 %
- les corticoïdes : 14,6 %
- autres médicaments : 5,29 %

Le pourcentage d'enfants qui ont reçu :

- des antibiotiques : 98,98 % (Taux réellement élevé).
- des antipyrétiques : 97 %
- des corticoïdes : 24,24 % (Taux élevé et injustifié)
- des antitussifs + BD : 55,67 %

P. 23 : PROFIL DU MALADE DIABETIQUE DANS LA REGION DE SBETLA A PROPOS DE 100 CAS

AUTEURS : DRS : Dr. BEN YOUSSEF F., Dr. BEN YOUSSEF A.,
Dr ESSAFI M., Dr. ALOUI M.T., Dr. GHODBANI M.M.

Le diabète sucré est une affection grave qui se répond de plus en plus partout dans le monde.

Dans notre région, cette affection reste mal dépistée avec une prévalante de 1,11 % en milieu urbain et 0,21 % en milieu rural.

Afin de renforcer cette activité de dépistage et dans le but d'améliorer la prise en charge de nos malades, une enquête prospective a été menée auprès de 100 Patients suivis au dispensaire de ville de Sbeitla et qui a porté sur l'étude du profil étiopathogénique et évolutif des patients, à savoir : l'âge, le sexe, le type de diabète, les antécédents, les habitudes, recherche de signes cliniques orientant vers une complication, un bilan a été pratiqué pour chaque malade dans le but d'évaluer l'équilibre du diabète.

Les résultats mettent en évidence :

- Un malade assez âgé avec un âge moyen : 52,7 ans ayant au moyenne 6 enfants avec antécédents d'enfants décédés 1 fois sur 2.
- Des antécédents familiaux de diabète sont retrouvés dans 43 % des cas.
- L'association diabète HTA est retrouvée chez 36 % des patients.
- Le diabète est insulino-dépendant environ 1F sur 3 et i est équilibre uniquement dans 22 % des cas, il existe souvent des signes cliniques orientant vers une complication chronique.

Tous ces signes incitent à dépister le diabète à un stade précoce et à améliorer sa prise en charge.

P. 24 : MALADIE DE TAKAYACHU A PROPOS D'UN CAS

AUTEURS : Dr. BEN REHOUMA S., KOCHBAT S., KARMA F.,
KSONTINI I., MOOJAAT R., BCHIR S.,
CHERIF O., ROKBANI L.

Service Médecine Interne Habib Thamer Tunis

C'est une artérite inflammatoire segmentaire survenant électivement chez la femme jeune.

Elle touche l'aorte et les artères de moyen calibre avec possibilité d'atteinte des artères pulmonaires.

Elle s'accompagne de manifestations générales liées au processus inflammatoire, suivies après un intervalle de temps variable de manifestations topographiques liées aux lésions artérielles séquellaires.

Nous exposons le cas de notre service survenant chez une jeune femme de 35 ans avec ses démarches diagnostiques, thérapeutiques et évolutives.

P.25 : ASSOCIATION MALADIE DE BIERMER ET INSUFFISANCE SURRENALIENNE AUTO-IMMUNE.

AUTEURS : Dr. BEN REHOUMA S., KOCHBATI S., KARMA F.,
KSONTINI I., BCHIR S.; MOOJAAT R., CHRIF O
ROKBANI L.

Service Médecine Interne Habib Thamer Tunis

L'insuffisance surrénalienne chronique (maladie d'Addisson), de diagnostic relativement aisé quand elle s'accompagne de mélanodermie, est fréquente en Tunisie, liée à une destruction surrénalienne bilatérale d'origine tuberculeuse. La négativité du bilan tuberculeux et l'association à une autre maladie auto-immune chez une patiente de 40 ans nous a orienté vers une origine auto-immune de cette maladie.

P. 26 : LA RETINOPATHIE DIABETIQUE A PROPOS DE 40 OBSERVATIONS

AUTEURS : Dr. BEN AMMAR HAYET, Dr. BEN AMOR NABIL,
Dr. ARFAOUI B., Dr. BEN ALI A.

Hôpital Régional de ZAGHOUAN

La rétinopathie Diabétique (RD) est une complication dégénérative grave de la maladie diabétique, c'est la principale cause de cécité chez les diabétiques.

L'examen des yeux pour tous les diabétiques permet de détecter précocement cette complication et de la prendre en charge à temps.

Dans notre étude la RD a été retrouvée dans 27,5 % des cas. Elle apparaît d'une façon plus fréquente à partir de l'âge de 55 ans (37,5 %) son risque d'apparition s'accroît avec l'ancienneté du diabète (62,5 %) par 15 ans d'ancienneté). Le diabétique HTA à trois fois plus de risque de développer un RD qu'un patient uniquement diabétique.

27 : LES INTOXICATIONS AIGUES DOMESTIQUES LA VILLE DE KASSERINE AU COURS DE LA SAISON HIVERNALE 97/98 : ASPECTS CLINIQUES, ETIOLOGIQUES ET SOCIAUX.

AUTEURS : Drs : JELLITI M.; ZORGUI A.; ILAHI Y.; MISSAOUI MN.;
Mlle ZORGUI S.

HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE

Il s'agit d'un travail prospectif réalisé au service des urgences de l'Hôpital Régional de Kasserine durant les mois de Décembre 1997, Janvier et Février 1998.

Nous avons étudié les aspects cliniques, étiologiques et socio-culturels de tous les cas d'intoxications aiguës domestiques survenus dans la ville de Kasserine et ses banlieux, qui ont consulté à notre service à partir du 1er Décembre 1997 jusqu'au 28 Février 1998.

Nous avons constaté :

- * *L'absence de cas d'intoxication mortelle (aucun décès).*
- * *L'évolution favorable de la majorité des cas après les soins effectués aux urgences.*
- * *La prédominance des intoxications en rapport avec la saison et le système de chauffage domestique (CO, Pétrole ...).*
- * *L'importance du nombre de cas d'intoxication volontaire chez les sujets jeunes et de sexe féminin.*
- * *L'influence du niveau socio-économique sur le motif et la nature de l'intoxication.*

P. 28 : MALADIE D'APERT : A PROPOS D'UN CAS

AUTEURS: Drs. FREJ A. MISSAOUI M N. KALLEL H. DAOUED H.
HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE

La maladie d'Apert est un syndrome Polymalformatif rare, elle se manifeste par une acrocephalosynactylie de découverte prénéo- natale.

Nous rapportons l'observation d'un nouveau né de sexe masculin issu d'un mariage consanguin de 2 degrés.

L'examen à la naissance note une synadactylie des mains et des pieds ainsi qu' une craniostenose et une fente palatine.

P29 - EVALUATION DES RESULTATS DU PROGRAMME DE LUTTE ANTIDIARRHEIQUE DANS LA REGION DE SBEITLA

**AUTEURS : Drs : BEN YOUSSEF F. ; BEN MANSOUR A. ; ESSAFI ;
GHODHBANI M.M.**

CIRCONSCRIPTION DE SBEITLA

La maladie diarrhéique continue à sévir et figure parmi les dix infections les plus courantes dans le monde .

Le programme national de lutte anti - diarrhéique nous a permis à travers l'étude de 3 indicateurs (graviter, fréquence, prise en charge) de mieux contrôler cette maladie.

L'étude des résultats de ce programme sur une période de 4 ans nous a permis de tirer les conclusions suivantes :

- 1- La fréquence de la diarrhée reste élevée .*
- 2- La diarrhée est diagnostiquée dans plus de 99% des cas à un stade précoce (score de déshydratation = 1).*
- 3- Concernant la prise en charge :*

- Tous les enfants ont bénéficié d'une hydratation par voie orale ;*
- La prescription d'antibiotique et / ou d'antiseptique reste élevée (sup à 80%)*
- Un syndrome infectieux (surtout respiratoire) est présent chez 7 cas sur 10*

P30 - LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUE DANS LE CSSB MOGRANE

AUTEURS : Drs : BEN AMMAR H- BEN AMOR N-

Hôpital de Zaghouane

371 enfants de moins de 5 ans ont été pris en charge pour toux et/ou difficultés respiratoires , dans le CSSB de MOGRANE .

76% des enfants ont un âge supérieur ou égal à un an .

57% des cas ont présenté une affection autre que l'IRA .

78% des cas on bénéficié d'une antibiothérapie .

P32- KYSTE HYDATIQUE DU CERVEAU A propos d'un cas

AUTEURS : DRS : FREDJ A- KALLEL H- MISSAQUI MN
DAOUED H

L'hydatidose est une maladie parasitaire fréquente constituant un véritable problème de santé publique dans notre pays.

Les localisations hépatique et pulmonaires sont les plus fréquentes ; mais tous les organes peuvent être touchés. A ce sujet, les auteurs rapportent une localisation cérébrale du kyste hydatique associé à une autre kyste au niveau du poumon droit chez une fillette de 7 ans dont le motif de consultation n'a pas été une symptomatologie respiratoire mais un syndrome d'HTIC.

P. 31 : INTERET DE L'ETUDE DE LA SATISFACTION DES MALADES DANS LE PROJET DE L'AMELIORATION DE LA QUALITE

AUTEURS: D. ZORGUI. A; MESSAOUDI. Z; MISSAOUI. N; JELLITI. M.

HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE

Dans l'amélioration continue de la qualité il faut partir du point de vue du patient, ou des besoins de la population desservie, pour en déduire les améliorations de la qualité, et non faire l'inverse; c'est à dire partir dans des raisonnements d'organisation pour en déduire par la suite ce que peut être la satisfaction du patient.

Une étude de la satisfaction des patients au service de médecine interne à été engagée durant le mois d'avril 1998, elle inclut toutes les étapes de la prise en charge; depuis l'entrée du patient jusqu'à sa sortie en passant par les soins la prise en charge médicale et la restauration.

Les résultats du questionnaire nous ont permis de localiser plusieurs anomalies dans notre activité et de dresser un programme d'action afin de remédier à certaines défaillances.

P32- KYSTE HYDATIQUE DU CERVEAU **A propos d'un cas**

AUTEURS : DRS : FREDJ A- KALLEL H- MISSAOUI MN
DAOUED H

L'hydatidose est une maladie parasitaire fréquente constituant un véritable problème de santé publique dans notre pays .

Les localisations hépatique et pulmonaires sont les plus fréquentes ; mais tous les organes peuvent être touchés . A ce sujet , les auteurs rapportent une localisation cérébrale du kyste hydatique associé à une autre kyste au niveau du poumon droit chez une fillette de 7 ans dont le motif de consultation n'a pas été une symptomatologie respiratoire mais un syndrome d'H.T.I.C.

P33- UN NOUVEAU CAS DE KYSTE HYDATIQUE DE LOCALISATION RARE

Auteurs : DR HEDHILI A .-ABBES A.
Sce de Chirurgie ELJAM

Il s'agit d'une patiente âgée de 53 ans issue d'une région de faible endémicité hydatique qui consulte pour une masse paravertébrale droite depuis l'âge de 5ans , et qu'il y a quelques mois devient douloureuse . L'exploration (ECHO + TDM) évoque un kyste hydatique et l'intervention le confirme .

On discute à l'occasion de cette observation et à la revue de la littérature les localisations rares de la maladie hydatique et de son évolution parfois très longue .

P34- SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA TUBERCULOSE A KASSERINE (1997)

AUTEURS : Drs. GHARSALLI . A. ; AMRI. A. ; ABASSI. R.

MAHMOUDI. B.- JABALLI. M.H.

- *La tuberculose, la maladie infectieuse la plus meurtrière chez les adultes dans le monde.*
- *A Kasserine la situation épidémiologique est stationnaire depuis une décennies.*
- *Une enquête prospective sur les cas de tuberculose enregistrés dans la région de Kasserine en 1997 (84 cas) .*
- *Les résultats relevés sont les suivants :*
 - *Taux d'incidence : 20.26 /100000 habitants.*
 - *La tuberculose pulmonaire est la forme la plus fréquente (60.7 %)*
 - *Le diagnostic de la tuberculose établi définitivement au niveau de la structure hospitalière est de 71.4 %.*

- *La contagion est présente dans 16.7 % des cas.*
- *La tuberculose touche la tranche d'âge la plus productive de la société (16à60 ans) 78.6 % .*
- *Le sexe ratio est de : 1.15 .*
- *La tuberculose touche surtout les niveau socio-économiques les plus faibles :*
 - *Les analphabètes 56 %*
 - *Les sans professions 45 %*

P35 - DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DE LA RESPIRATION BUCCAL

AUTEURS : .Drs : ELTEIEF .N. ; BEN AMORA ;.EL HAOUITI. K. ; BEL KAHLA. I ; TOBJI. S.

La respiration buccale est une dysfonction oro-faciale qui peut se répercuter sur la croissance des maxillaires et des procès alvéolo-dentaires. C'est pourquoi, il nous paraît indispensable de mettre l'accent sur se type de dysfonction dans le but de détecter au plutôt cette pathologie et d'éviter ainsi les complications qui s'en suivent.

P36- EVALUATION DE LA QUALITE DES SERVICES DANS LES CONSULTATIONS EXTERNES MEDICALES (Programme d'amélioration)

*AUTEURS : Drs. : ZORGUIA ; BELGASMI . H. ; MISSAOUI. MN ;
JELLITI. M. ; KHELIL. H.*

*La consultation externe médicale, assure la prise en charge de
deux catégories de malades :*

- *Les malades adressés des dispensaires et des hôpitaux de circonscription*
- *Le suivi des malades hospitalisés au service de médecine interne.*

*L'étude de l'activité de cette consultation a permis de dégager
plusieurs anomalies entravant son fonctionnement.*

- *Le grand nombre de malades affluant vers cette consultation.*
- *Plusieurs malades ne sont pas attendus à la consultation*
- *Certains malades ne sont pas souvent munis d'un bilan minimum.*
- *La multiplicité des spécialités médicales prises en charge au sein de cette consultation.*

*L'équipe de médecine interne propose dans ce travail un programme
d'action visant à améliorer tous les cotés de cette prise en charge ;
afin de la rendre globale, efficace sur le plan des soins et des résultats,
et vraisemblablement efficace sur le plan économique*

P37- EVALUATION DU PROGRAMME DE LUTTE ANTIRABIQUE DANS LA REGION DE SIDI BOUZID

*AUTEURS : Mrs : HAFDHOUNI ABDESSATTAR - LE FAHEM ABDELKRIM
Drs : KACEM J. - ACHOURI H. - AHMADI M.Z.*

Malgré l'absence de cas de rage humaine depuis 1994, la déclaration annuelle de quelque cas de rage animale dans la région de Sidi Bouzid constitue un danger imminent.

Grâce a une sensibilisation massive, et l'amélioration de la prise en charge des mordus, le taux des défaillants ne cesse de diminuer tendant vers l'annulation, mais le contrôle de la population canine en l'occurrence, la vaccination et l'abattage restent en deça des objectifs tracés (30 %).

Les auteurs présenteront :

- *Une évaluation des différents volets du programme .*
- *Les recommandations nécessaires pour la réussite de ce programme.*

P 38 :UN CAS DE RETINOBLASTOME BILATERAL CHEZ UNE FILLE DE DEUX ANS

AUTEURS : Drs DAOUED. H ; KALLEL H ; FREDJ A ; MISSAOUI M.N

HOPITAL REGIONAL DE KASSERINE

Nous exposons le cas d'une fille agée de deux ans qui présente un rétinoblastome bilatéral à un stade assez avancé.

Le rétinoblastome est une affection congénitale rare maligne de la rétine, métastatique qui peut gêner le pronostic vital. Son extension spontanée et locale loco-régionale et générale. Le traitement varie selon la taille, l'extension, le caractère uni ou bilatéral de la tumeur.

P39- LE VOLVULUS DU CAECUM A PROPS D'UN CAS

AUTEURS : Drs : BENNAISSA M- CHTOUROU R- BELHANI A

HOPITAL MEZEL TMIM

Les auteurs rapportent l'observation d'un jeune de 22 ans ayant une dextro cardie qui se présente avec une occlusion intestinale basse en rapport avec un volvulus de caecum .

Attirons l'attention sur la difficulté du diagnostic clinique de cette pathologie et l'importance de la précaution de la prise en charge chirurgicale.

*Madame La Présidente Directeur Général de
IONFJ*

*Monsieur le Directeur Général de
SODCO*

*Monsieur Le Président Directeur Général de
la société Cellulose*

*Le Directeur de la Régulation en Tunisie
(AGT)*

*Les médecins des caravanes de santé de
R.G.D.*